Dokumenttyp	Ansvarig verksamhet	Organisation	Version
Rutin	Smittskydd Värmland	Region Värmland	6
Dokumentägare	**Fastställare**	**Giltig fr.o.m.**	**Giltig t.o.m.**
Monika Carlson Hygiensjuksköterska	Andreas Harling Smittskyddsläkare	2025-06-23	2027-06-23

Erysipelas (rosfeber)

Gäller för: Hälso- och sjukvård

 Tillämpa basala hygienrutiner

Sjukdom

Erysipelas (rosfeber) orsakas oftast av betahemolytiska streptokocker grupp A, men grupp C och G förekommer.

Betahemolytiska streptokocker grupp A kan orsaka halsfluss, svinkoppor, scharlakansfeber och sårinfektioner inkl. nagelbandsinfektioner. Den kan förekomma i svalget hos friska, symtomfria personer men förekommer normalt inte på huden.

Smittspridning

Smitta sprids via direkt och indirekt kontaktsmitta från sårsekret och som droppsmitta vid halsinfektion.

Smittdos

För mottagliga individer räcker låga smittdoser.

Placering

Patient med vätskande blåsor/sår:

- bör inte sitta i väntrum
- ska vårdas på eget rum med egen toalett och stängd dörr
- märkning av vårdrum enligt rutin: gul skylt
- kan samvårdas efter minst två dygn, med adekvat antibiotikabehandling och minskad rodnad, med annan patient utan sår
- uppmana patienterna att tvätta händerna före måltid och efter toalettbesök och använda handdesinfektionsmedel.

Patient med hel hud:

- kan samvårdas med annan patient utan sår.

Patienthotellet

- Patient med erysipelas kan vårdas på Patienthotellet.
- Patient med blåsor eller erysipelas i ansiktet ska serveras mat på rummet.
- Patient med erysipelas utan blåsbildning (enligt daglig hudinspektion av sjuksköterska) kan vistas i matsalen.
- Någon minimigräns för föregående antibiotikabehandling på grund av erysipelas innan vård på Patienthotellet finns inte, det vill säga patient med erysipelas kan vårdas på Patienthotellet från och med första dygnet med antibiotikabehandling.

Besökande

Besökande till patienten har inga restriktioner. Uppmana dem att tvätta eller desinfektera händerna när de kommer och går.

Disk
Hanteras som vanligt.

Tvätt
Tvättsäck på rummet. Hanteras som vanlig tvätt.

Avfall
Sopsäck på rummet. Hanteras som vanligt avfall.

Daglig städning
- Kontaktytor – avtorkning med ytdesinfektionsmedel med tensid.
- Golv och toalett – förfuktade moppar alternativt rengöringsmedel och vatten.
- Städstativet ska desinfekteras efter användning på rummet.

Slutstädning vårdrum
- Säng, sängbord och övriga ytor – mikrofiberduk alternativt rengöringsmedel och vatten.
- Golv och toalett – förfuktade moppar alternativt rengöringsmedel och vatten.
- Städstativet ska desinfekteras efter användning på rummet.
- Kassera engångsmaterial som kan ha kontaminerats.

Mer information om erysipelas (rosfeber) på Smittskydd Värmlands webbplats

Utarbetad av: Monika Carlson