Dokumenttyp	Ansvarig verksamhet	Organisation	Version
Instruktion	Smittskydd Värmland	Region Värmland	10
Dokumentägare	**Fastställare**	**Giltig fr.o.m.**	**Giltig t.o.m.**
Helen Jansson Hygiensjuksköterska	Anna Skogstam Smittskyddsläkare	2026-02-09	2028-02-09

Städ- och desinfektionsschema

Gäller för: Hälso- och sjukvård

Schemat för städ- och desinfektion nedan är indelat i smittämne, punktdesinfektion vid spill, daglig städning och slutstädning. Daglig städning och slutstädning är i sin tur indelade i golv och övriga ytor.

***Städ- och desinfektionsschema**. Smittämnen som inte är upptagna i schemat: städning med förfuktade moppar.*

Smittämne	**Punktdesinfektion vid spill**	**Daglig städning**		**Slutstädning**		
		Golv	**Övriga ytor***	**Golv**	**Övriga ytor***	
Blodsmitta	Ytdesinfektionsmedel Des +45 eller Des +72 Vid stort spill Virkon**	Förfuktade moppar	Mikrofiberduk	Förfuktade moppar. Vid blödning, slutstädning med Virkon**	Mikrofiberduk. Vid blödning, slutstädning med Virkon**	Städstativet ska desinfekteras efter användning på rummet.
Calici- och rotavirus	Virkon**	Förfuktade moppar	Virkon**	Virkon**	Virkon**	Städstativet ska desinfekteras efter användning på rummet.
Clostridioides difficile	*Kräkning/avföring:* Virkon** *Övr. kroppsvätskor:* Des +45 eller Des +72 kan användas som alt. för Virkon.	Förfuktade moppar	Mikrofiberduk	Virkon**	Virkon**	Städstativet ska desinfekteras efter användning på rummet.
ESBL **utan** riskfaktorer ****	Ytdesinfektionsmedel Des +45 eller Des +72	Förfuktade moppar	Mikrofiberduk	Förfuktade moppar	Mikrofiberduk	Städstativet ska desinfekteras efter användning på rummet.
MRSA, ESBL carba, ESBL **med** risk-faktorer****, pseudomonas aeruginosa, multiresistent, acinetobacter, karbapenemresistent	Ytdesinfektionsmedel Des +45 eller Des +72.	Förfuktade moppar	Ytdesinfektionsmedel Des +45 eller Des +72.	Virkon**	Virkon**	Städstativet ska desinfekteras efter användning på rummet. Oanvänt material för engångs-bruk kasseras.
VRE	*Kräkning/avföring:* Wet wipe klorduk *Övr. kroppsvätskor:* Ytdesinfektionsmedel Des +45 eller Des +72.	Förfuktade moppar	Daglig städning med ytdesinfektionsmedel Des +45 eller Des +72.	Slutenvård: Actichlor Plus***	Slutenvård: Wetwipe klorduk eller Actichlor Plus***	Rumsbunden städutrustning. Städstativet ska desinfekteras efter användning på rummet. Oanvänt material för engångs-bruk kasseras.
				Poliklinisk/dagvård: Kontaktytor och toalett avtorkas med ytdesinfektionsmedel. Vid läckage eller vistelse >1 timme städas rum och toalett med Virkon.		
Tarmsmitta – oklar diarré	Ytdesinfektionsmedel Des +45 eller Des +72. Vid stort spill Virkon**	Förfuktade moppar	Ytdesinfektionsmedel Des +45 eller Des +72.	Virkon**	Virkon**	Städstativet ska desinfekteras efter användning på rummet.
Tuberkulos – öppen smittsam	Ytdesinfektionsmedel Des +45 eller Des +72. Vid stort spill Virkon	Förfuktade moppar	Ytdesinfektionsmedel Des +45 eller Des +72.	Virkon**	Virkon**	Använd andningsskydd. Städstativet ska desinfekteras efter användning på rummet.

Vid all städning är den mekaniska bearbetningen viktig

* Övriga ytor: kontaktytor som till exempel säng, sängbord, dörrhandtag, ljusknappar, överdel på skåp, sängbord, spolknopp, handfat och kranar på handfat och dusch, hjälpmedel.

** Virkon: Blandad Virkonlösning är hållbar 5 dygn enligt tillverkaren.

*** Spädning av Actichlor Plus. Använd handskar. Fyll först på **kallt** vatten och lägg sedan i en tablett. Det tar 10–15 minuter innan tabletten är upplöst. Om varmt vatten används kan en viss gasbildning ske. Färdig lösning har en hållbarhet på 24 timmar.

**** Riskfaktorer:

- diarré
- stomi med ökat flöde
- urinvägskateter, inkl. RIK
- urininkontinens med läckage till omgivningen
- dränage och andra hudpenetrerande slangar, inkl. pyelostomi (utom PVK/central infart)
- infekterade och vätskande sår
- oförmåga att medverka i givna hygienrutiner, till exempel hos patient med kognitiv svikt.

Utarbetad av: Smittskydd Värmland