

Rapport vid transfusionsreaktion

Patient-ID		Avd	
Om transfusionsreaktionen är rapporterad via Interinfo krävs endast ifyllnad av rutorna "Enhet" och "Förlopp".			
Bedömning av reaktionens svårighetsgrad <input type="checkbox"/> Lätt <input type="checkbox"/> Måttlig <input type="checkbox"/> Svår Vid svår reaktion tag omedelbar kontakt med blodcentralen.		Transfusion <input type="checkbox"/> Erythrocyter <input type="checkbox"/> Plasma <input type="checkbox"/> Trombocyter <input type="checkbox"/> Övrigt	
Aktuella symptom <input type="checkbox"/> Enstaka utslag <input type="checkbox"/> Blodtrycksfall <input type="checkbox"/> Generell rodnad <input type="checkbox"/> Blodtrycksstegring <input type="checkbox"/> Urtikaria <input type="checkbox"/> Pulsstegring <input type="checkbox"/> Quinckeödem <input type="checkbox"/> Arytmi <input type="checkbox"/> Petekier <input type="checkbox"/> Illamående/kräkning <input type="checkbox"/> Anafylaktisk chock <input type="checkbox"/> Tryckkänsla över bröstet <input type="checkbox"/> Astma <input type="checkbox"/> Kramper <input type="checkbox"/> Andningsbesvär <input type="checkbox"/> Diarré <input type="checkbox"/> Dyspné <input type="checkbox"/> Lumbal smärta <input type="checkbox"/> Hypoxi <input type="checkbox"/> Buksmärta <input type="checkbox"/> Cyanos <input type="checkbox"/> Hemoglobinuri <input type="checkbox"/> Huvudvärk <input type="checkbox"/> Ikterus <input type="checkbox"/> Feber <input type="checkbox"/> Yrsel <input type="checkbox"/> Frysningar/Frossa <input type="checkbox"/> Blödning <input type="checkbox"/> Temp <input type="checkbox"/> Chock stegring..... °C <input type="checkbox"/> Angioödem börjar kl..... <input type="checkbox"/> Röntgenfynd duration.....h <input type="checkbox"/> Övrigt		Enhet/er nr (tappningsnummer) Förlopp Transfusionen påbörjades den..... kl..... och avbröts kl..... då hela enheten/ca.....mL givits. Transfusionsreaktion observerades: datum..... kl..... Rapporten lämnad av: Blodprover tagna för utredning <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Blododling på patient är tagen/pågå	
Orsakssamband mellan transfusion och patientens symtom: <input type="checkbox"/> kan ej bedömas <input type="checkbox"/> sannolikt <input type="checkbox"/> pågående/precis avslutade infusioner: <input type="checkbox"/> möjligt <input type="checkbox"/> säkert 			
Har transfusionsreaktion förekommit tidigare? Var? När? Och med vilka symptom?			
Blodcentralen anteckningar Rapport mottagen: kl: Datum: Sign: Prov taget före transfusion <input type="checkbox"/> finns <input type="checkbox"/> saknas Anm: Prov tagna efter transfusion <input type="checkbox"/> erhållet <input type="checkbox"/> ej erhållet Anm: Blodenheter/-er mottagna <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej Datum: Sign: Undersökta enheter/-er <input type="checkbox"/> utan anmärkning <input type="checkbox"/> anmärkning Sign: Kontaktat läkare på blodcentralen <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej Datum: Sign: <input type="checkbox"/> Lätt reaktion ingen utredning utförs Sign: Rapporterad till AHA <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej Datum: Sign: Rapport till IVO <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej Datum: Sign:			

Upplysningar

I **Transfusionsanvisningar (RIK-03728)** finns ett avsnitt om transfusionsreaktioner som kan vara till hjälp vid gradering av transfusionsreaktionen samt förslag på handlingsplan vid inträffad reaktion.

Skriv av påsens/arnas tappningsnummer (om flera komponenter har givits samma dag). Ange även andra pågående eller precis avslutade infusioner.

Lätta snabbt övergående reaktioner är provtagning **ej** nödvändig, men rapportering på denna blankett skall göras till blodcentralen.

Måttliga och **svårare** reaktioner utreds alltid och prov för transfusionsreaktionsutredning tas:

- Venblod: 2 st 6 mL EDTA-rör (lila propp) och 2 st 6 mL Serumrör (röd propp), tillsammans med remiss, **BLODCENTRALEN (FOR-27381)** i Vida.
- Patientidentiteten ska vara intygad.
- Denna rapport, proverna med tillhörande remiss, samt väl försluten blodpåse inkl. aggregat i separat plastpåse lämnas på blodcentralen.

Temperaturstegring, mer än 2°C eller uppkommen feber 39°C eller mer, utreds genom att blododling tas på patienten. Blodcentralen ombesörjer att sparade blodrester från transfusion lämnas till mikrobiologen för odling.

Vid "övrigt" fylls diagnos i om den kan tänkas påverka transfusionsreaktionen. Andra symptom som blödning, hetta, halssvullnad, domningar, stickningar samt slöhet/förvirring kan förekomma, de anges vid "övrigt". Ange tidigare temperaturstegringar och duration, samt vad som orsakat den. Medicinering som kan påverka förloppet, bör anges liksom tidigare misstänkta transfusionsreaktioner.

Ta gärna kontakt med oss på blodcentralen om något är oklart.

Utarbetad av: Kajsa Lindqvist