

Dokumenttyp Remittentanvisning	Ansvarig verksamhet Bild- och funktionsdiagnostik	Organisation Region Värmland	Version 5
Dokumentägare Susanne Sjöstedt biomedicinsk analytiker	Fastställare Carola Wretling Tf verksamhetschef	Giltig fr.o.m. 2026-03-25	Giltig t.o.m. 2028-03-24

Duplex Carotis

Gäller för: Hälso- och sjukvård

Remittentanvisningar Duplex Carotis

Halsens artärer undersöks med ultraljud för att hitta eventuella stenoser och större plack som kan vara orsak till ffa akuta neurologiska bortfallssymtom. Kärllanatomi och förändringar dokumenteras och flödeshastigheten på blodet registreras med doppler.

Indikationer

- Akuta neurologiska bortfallssymtom såsom TIA, minor stroke, amaurosis fugax
- Misstanke om dissektion eller arterit
- Preoperativ undersökning
- Uppföljning efter stentning

Kontraindikationer

- Inga absoluta kontraindikationer
- Undersökningen utförs inte på enbart pga blåsljud på halsen eller vid symtom som inte härrör från carotis försörjningsområde.

Förberedelser

Inga

Remissinformation

Kort anamnes, beskrivning av patientens symtom med sidoangivelse och när symtomen inträffade.

Utförande

Patienten undersöks liggande på en brits och en ultraljudsgivare förs utmed halsen, även bukaortan undersöks som rutin. Undersökningen tar ca 30 min.

Resultat

Svar skickas till inremitterande läkare.

Utarbetad av: Susanne Sjöstedt